

覆蓋作物準則的執行情況菥蓂 (*Crotolaria* 芥菜) , 蕎麥 (蕎麥) 或燕麥 (燕麥)

覆蓋作物治療目標或目的：

- 提高土壤質量 (增加土壤有機質和生物活性 , 提高磷的供應 , 生產場源或氮氣)
- 減少土壤侵蝕和沉積到河流和近岸水體
- 蟲害管理控制雜草和土壤傳播的疾病
- 景點的益蟲 (害蟲天敵 , 蜜蜂)
- 減少成本 (化肥 , 農藥 , 燃料)

場地準備：準備實地消除任何雜草和覆蓋作物種植面積。除草劑，如草甘膦產品，可以用來清洗領域之前，雜草覆蓋作物種植。覆蓋作物種植不應後 7 天內除草劑應用，否則，損害或死亡的新興幼苗可能會發生。

播種率： 蘇恩大麻播種率：40 磅/英畝

蕎麥播種率：60 磅/英畝

燕麥播種率：70 磅/英畝

播種：對於小型字段或間作，種子可以播放無論是手工或手動播放肥料/種子傳播者。對於較大的種子傳播領域的機械 (拖拉機安裝與化肥/種子傳播者) 和/或種子鑽探可能更為經濟。

法團：重要的是，有足夠的土壤種子接觸，最好是將種子後很快蔓延。在小領域或行，這可以通過使用一塊勾花網拖後面 4 惠勒 (全地形車 , 沙灘車) 或耙對土壤的種子。在更大的領域輕耙，以不超過 1 英寸厚的建議。

計時與灌溉的要求：如果種子種植只是在雨季來臨前 (10 月中旬 , 通過 4 月中旬) , 沒有灌溉是必要的任何上述覆蓋作物。在乾燥的夏季的灌溉需要。注意：當南，南與種植大麻是在 9 月和 12 月將花很快 (一般 6 週內種植) 。種子生產，這是可取的。此外，南，南麻，工廠將在 2008 年 9 月短年 12 月的時間，因為開花的反應。蘇恩大麻種植 1 月至 8 月將成為高 (5 英尺+) , 從而增加其效用作為防風林。蕎麥和燕麥不是，一般時間的影響，今年玉米播種面積。

萌發及編制：編制時間約為 7-10 天，所有 3 種類型的覆蓋作物。菥蓂將在 24 小時內發芽。蕎麥，燕麥，發芽 72 小時內收到的水分。

管理：一般沒有很大的完成方面的管理。一旦作物種植和水分收到最好的辦法是離開覆蓋作物單。不施肥，不灌溉，病蟲害控制，沒有作出努力。盡量減少覆蓋作物管理與成本最小的做法，從而使其更具吸引力種植者。

• [Buckwheat Cover Buckwheat/Sunn Hemp/Oats Seeds Pictures???](#)